

# Uputstvo za korišćenje Jacutin® spreja protiv vašljivosti



Specijalan sprej podići i sa rastojanja od 1-2 cm direktno naprskati kožu glave. Izbegavati prskanje očiju, nosa i usta. Ne gutati, ne inhalirati.



Tretirati suhu kosu pramen po pramen (od korena dlake do vrha). Ne zaboraviti zulufo i kosu uz vrat.

Kod kraće kose je dovoljan jedan pritisak na raspršivač (1-2 sekunde) po pramenu, a kod duge i guste kose dva kratka pritiska na raspršivač. Sva kosa glave se mora ravnomerno navlažiti.



Ne pokrivati kosu i ostaviti da preparat deluje 30 minuta, a zatim kosu oprati šamponom i više puta temeljno isprati. Zatim uz pomoć češlja za vaši (npr. Jacutin® češalj za vaši) iščešljati vaši i gnjide.



Da bi tretman bio uspešan, potrebno je izvršiti kontrolu nakon 8 dana. Ako se tada pronađu vaši ili žive gnjide, tretman se mora ponoviti.

## Uputstvo za korišćenje Jacutin® spreja protiv vašljivosti za stidne vaši

Zaražene delove tela (npr. stidne dlaciće zajedno sa dlacicama u pregibima i po nogama) tretirati na isti način kao glavu.

Delove tela koji su tretirani Jacutin® sprejom protiv vašljivosti oprati posle 30 minuta sapunom/sindetom i više puta temeljno isprati.

## Šta još možete učiniti?



Posteljinu i donji veš prati na 60°C.



Komadi odeće koji se ne peru na visokim temperaturama (npr. kape, šalovi, puloveri, jakne itd.), kao i plišane igračke, mogu se čuvati 24 sata u hladnjaku na temperaturi od najmanje -18°C ili 3 dana u dobro zatvorenoj plastičnoj kesi na sobnoj temperaturi.



Češljevi, četke, šnale za kosu itd. moraju se nakon svake upotrebe temeljno isprati vrelom vodom.



Dlake sa presvlaka nameštaja, tepiha, sedišta u automobilu itd. je najbolje usisati usisivačem. Glatke podne obloge je dovoljno obrisati mokrom krpom.



Vaši su prevelike da bi upale u unutrašnjost dušeka ili jastuka. Zato je potpuno dovoljno oprati navlake.

## Posebna uputstva za primenu Jacutin® spreja protiv vašljivosti

Samo za spoljnu primenu.

Jacutin® sprej protiv vašljivosti koristiti samo u dobro provetrenim prostorijama.

Korišćenje, odnosno udisanje, većih količina Jacutin® spreja protiv vašljivosti izbegavati.

Jacutin® sprej protiv vašljivosti ne koristiti u prva tri meseca trudnoće, kod novorođenčadi, dojilja, u slučaju alergije na sastojke, kod astmatičara ili osoba sa plućnim bolestima. Jacutin® sprej protiv vašljivosti je zapaljiv. Ne prskati prema otvorenom plamenu ili telima koja isijavaju (npr. grejne ploče).

Ne tretirati u blizini otvorenog plamena (npr. gasne grejalice). Jacutin® sprej protiv vašljivosti je štetan za hladnokrvne životinje (vaši, buve, reptili, ribe itd.) i ne sme se koristiti za kućne ljubimce.

Jacutin® sprej protiv vašljivosti se može kupiti u apoteci bez recepta.

Ostale informacije naćićete na adresi [www.laeuse.de](http://www.laeuse.de)