

## Инструкция по применению: информация для пользователя

### Jacutin® Pedicul Spray

Аллетрин I, пиперонилбутоксид

**Внимательно прочитайте инструкцию по применению лекарства, прежде чем начнете его применять, так как в ней содержится важная информация.**

Всегда применяйте лекарство в точности так, как описано в инструкции, и в точности в соответствии с указанием врача или сотрудника аптеки.

- Сохраните инструкцию по применению лекарства. Она может понадобиться вам позже.
- Обратитесь к сотруднику аптеки, если вам понадобится дополнительная информация или совет.
- Если вы заметите побочные действия, обратитесь к врачу или сотруднику аптеки. Это также касается побочных действий, которые не приведены в этой инструкции по применению. См. раздел 4.

# Jacutin® Pedicul Spray

Что написано в этой инструкции по применению

1. Что такое **Jacutin Pedicul Spray** и для чего он применяется?
2. Что нужно учитывать перед применением **Jacutin Pedicul Spray**?
3. Как применять **Jacutin Pedicul Spray**?
4. Какие побочные действия возможны?
5. Как хранить **Jacutin Pedicul Spray**?
6. Содержимое упаковки и дополнительная информация

#### 1. Что такое **Jacutin Pedicul Spray** и для чего он применяется?

**Jacutin Pedicul Spray** – это спрей от паразитов, в особенности от головных, лобковых, платяных вшей **Jacutin Pedicul Spray** применяется против головных вшей (*Pediculus capitis*), лобковых вшей (*Pediculus pubis*, *Phthirus pubis*), платяных вшей (*Pediculus corporis*).

**Jacutin Pedicul Spray** уничтожает при точном соблюдении предписанных указаний по применению не только самих вшей, но и их личинок и гниды (яйца вшей). Как минимум не вылупливаются личинки или после вылупливания они нежизнеспособные, так что цикл развития вшей прерывается.

#### 2. Что нужно учитывать перед применением **Jacutin Pedicul Spray**?

**Jacutin Pedicul Spray** нельзя применять,

- если у вас есть аллергия к аллетрину I и 5-[2-(2-бутоксиэтокси)этоксиметилу]-6-пропилу-1,3-бензодиоксолу (пиперонилбутоксиду) или к одному из названных в разделе 6 прочих компонентов этого лекарства.
- если вы страдаете астмой или бронхо-легочными заболеваниями.
- для глаз и слизистых оболочек.

#### Предупреждения и меры предосторожности

Поговорите с сотрудником аптеки, прежде чем применять **Jacutin Pedicul Spray**. **Jacutin Pedicul Spray** предназначен только для наружного применения.

**Jacutin Pedicul Spray** воспламеняется. Не распылять при открытом пламени или на горячие предметы (напр., отопительные панели). Обработку **Jacutin Pedicul Spray** также нельзя проводить вблизи открытого пламени (напр., возле газовых горелок). Помещение, в котором проводится обработка, должно быть хорошо проветренным. Избегать проглатывания и вдыхания больших количеств **Jacutin Pedicul Spray**. В не проветриваемых помещениях не распылять большие количества **Jacutin Pedicul Spray**.

Астматики и лица с бронхо-легочными заболеваниями не должны вдыхать спрей, так как это может вызвать раздражение слизистых оболочек, вплоть до приступов астмы.

**Jacutin Pedicul Spray** нельзя применять вблизи от аквариума или террариума, так как это лекарство вредно для всех холоднокровных животных (напр., рыб, рептилий и т.д.).  
Используемый газообразователь не вредит озоновому слою.

## Дети

Для младенцев **Jacutin Pedicul Spray** применять нельзя.

## Использование **Jacutin Pedicul Spray** вместе с другими лекарствами

Проинформируйте врача или аптекаря, если применяете/принимаете другие лекарства, в течение небольшого времени применяли/принимали другие лекарства или собираетесь применять/принимать другие лекарства.

Возможно ослабление действия малатиона при одновременном или непосредственном последующем применении препаратов с активным веществом малатион.

## Беременность и кормление грудью

Если вы беременны или кормите грудью, если вы подозреваете, что беременны или собираетесь забеременеть, обратитесь за советом к врачу или сотруднику аптеки касательно применения этого лекарства.

**Jacutin Pedicul Spray** не следует применять в первые три месяца беременности, так как в результате испытаний на животных имеются указания на аномалии развития, а опыт наблюдений за людьми отсутствует.

**Jacutin Pedicul Spray** нельзя принимать в период кормления грудью.

## Способность к управлению транспортными средствами и машинами

Никакие особые меры предосторожности не нужны.

## 3. Как применять **Jacutin Pedicul Spray**?

Всегда применяйте это лекарство в точности так, как описано в инструкции, и в точности в соответствии с указаниями врача или сотрудника аптеки. Если вы в чем-то не уверены, переспросите врача или сотрудника аптеки.

Для применения на коже.

Если не прописано врачом иначе, применяйте **Jacutin Pedicul Spray** следующим образом:  
Одноразовой обработки при тщательном применении достаточно, чтобы уничтожить всех вшей, их яйца и личинок.

Обработку средством **Jacutin Pedicul Spray** проводить в хорошо проветриваемых помещениях и не вблизи от открытого пламени (напр., возле газовых нагревателей).

Вши преимущественно находятся возле корней волос, то есть вблизи от кожи. Чтобы добиться самого лучшего эффекта, важно распылять средство **Jacutin Pedicul Spray** непосредственно на кожу или кожу головы.



Головные вши



Для распыления открыть распылитель вверх. Расстояние при нанесении распылением: 1-2 см. Для предотвращения увеличенной области распыления, что может вызвать, например, раздражение дыхательных путей, производить его, прикрыв распылитель свободной рукой. При широком применении **Jacutin Pedicul Spray** (напр., в поликлиниках) распыляющему лицу рекомендуется защищать эту руку пластиковой или резиновой перчаткой (см. побочные действия).

**Jacutin Pedicul Spray** наносится на сухие волосы. Для уничтожения головных вшей средство следует нанести на все волосы на голове, также на затылок и на виски, пядь за пядью. При этом также следует учитывать длину и густоту волос. Для коротких волос достаточно одноразового кратковременного (1-2 секунды) распыления на каждой пяди, для длинных, густых волос на головку распылителя следует нажимать два раза, чтобы достичь равномерного легкого увлажнения волос на голове.

Процесс распыления следует начинать для корней волос на затылке, висках и затем перемещаться к середине головы.

После обработки волосы не покрывать.

Через 30 минут после обработки средством **Jacutin Pedicul Spray** помыть волосы водой с обычным шампунем и тщательно прополоскать их несколько раз. Остатки вшей и гнид можно вычесать гребешком с густыми зубьями (гребешок для вычесывания вшей и гнид, продается в аптеках).



Для гарантирования успеха обработки, то есть чтобы установить, действительно ли при первой обработке были уничтожены все вши и гниды, через 8 дней следует произвести контроль. Если при этом снова будут обнаружены вши или живые гниды, обработку следует повторить.

Если через 8 дней после второй обработки снова были обнаружены вши или живые гниды, обратитесь к врачу или сотруднику аптеки.

Вши легко переходят от носителя к носителю, поэтому рекомендуется во время опасности заражения (макс. 12 дней) обработать всех членов семьи кроме младенцев средством **Jacutin Pedicul Spray** под врачебным надзором, даже если вши были обнаружены только у одного человека.

#### ***Лобковые вши***

При обнаружении вшей соответствующие части тела с волосами (волосы в области гениталий, в промежности и на ногах) наносятся таким же образом, что и в случае с головными вшами. **Jacutin Pedicul Spray** наносится на сухие волосы. Через 30 минут обработанная **Jacutin Pedicul Spray** часть тела моется с мылом/моющим средством и несколько раз тщательно ополаскивается. В особенности у людей с сильно выраженным волосным покровом лобковые вши могут распространиться на живот, грудь, руки, бедра, подмышки, брови, усы и бороду.

Обязательно предотвратить попадание средства в глаза, для этого прикрыть их.

Чтобы предотвратить заражение и повторное инфицирование рекомендуется также обработать людей, которые были в контакте с уже инфицированными.

#### ***Платяные вши***

В случае с платяными вшами средством **Jacutin Pedicul Spray** обрабатываются зараженные предметы одежды. Для этого **Jacutin Pedicul Spray** распыляется с расстояния примерно в 20 см. Особое внимание следует уделять швам и подкладке. Повторить обработку через 8 дней.

Поговорите со своим врачом или сотрудником аптеки, если вам кажется, что действие **Jacutin Pedicul Spray** слишком сильное или слабое.

#### **Если применено большее количество **Jacutin Pedicul Spray**, чем следовало бы**

При надлежащем применении, как правило, отравления бояться не стоит. В связи с формой применения проглатывание препарата чрезвычайно маловероятно. Но если это произойдет (случайно или с умыслом), возможны такие симптомы, как тошнота, рвота и понос, а также судороги.

При появлении симптомов передозировки или при случайном проглатывании немедленно обратиться к врачу. Особое противоядие не существует. Меры зависят от конкретных симптомов и их следует принимать как можно скорее. После вдыхания больших количеств пиретроидов также аллетрина I) следует перейти в хорошо проветриваемое помещение или выйти на открытый воздух.

Если у вас есть дополнительные вопросы по применению этого лекарства, обратитесь к врачу или сотруднику аптеки.

#### **4. Какие побочные действия возможны?**

Как и все лекарства, это средство также может иметь побочные действия, которые, впрочем, проявляются не у всех. При указании частоты появления побочных действий учитываются следующие категории:

<b>Очень часто:</b>	больше 1 человека из 10
<b>Часто:</b>	от 1 до 10 человек из 100
<b>Иногда:</b>	от 1 до 10 человек из 1 000
<b>Изредка:</b>	от 1 до 10 человек из 10 000
<b>Очень редко:</b>	меньше 1 человека из 10 000
<b>Неизвестно:</b>	Частоту на основании имеющихся данных оценить нельзя

Часто после применения препаратов этой группы активных веществ (пиретроидов) сообщалось о местных нарушениях чувствительности (нарушениях чувствительности кожи).

При применении **Jacutin Pedicul Spray** зачесания могут возникать зуд и покраснение с ощущением легкого жжения, в особенности у светлокожих маленьких детей с нежной, чувствительной кожей. Эти явления исчезают через 1-2 часа после мытья головы.

В одном единственном случае в связи с применением **Jacutin Pedicul Spray** было сообщено об анафилактической реакции.

Астматики и лица с бронхо-легочными заболеваниями не должны вдыхать спрей, так как это может вызвать раздражение слизистых оболочек, вплоть до приступов астмы.

При появлении побочных действий следует прекратить применение **Jacutin Pedicul Spray** и обратиться к врачу.

Если **Jacutin Pedicul Spray** случайно попадает в глаза или на слизистые оболочки (в ротовую полость или носоглотку), может появиться раздражение. В таких случаях незамедлительно промыть соответствующее место холодной водой. Проглатывание или вдыхание больших количеств **Jacutin Pedicul Spray** может привести к тошноте, рвоте и поносу.

#### **Сообщение о побочных действиях**

Если вы заметите побочные действия, обратитесь к врачу или сотруднику аптеки. Это также касается побочных действий, которые не приведены в этой инструкции по применению. Вы можете сообщать о побочных действиях также непосредственно в Федеральный институт лекарственных средств и медицинских изделий Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, веб-сайт: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de). Сообщая о побочных действиях, вы способствуете тому, что предоставляется больше информации о безопасности этого лекарственного средства.

#### **5. Как хранить Jacutin Pedicul Spray?**

Храните это лекарственное средство в недоступном для детей месте.

Это лекарственное средство нельзя использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке и на баллончике средства. Срок годности всегда относится к последнему дню указанного месяца.

**Внимание!** Баллончик находится под давлением. Не допускать нагревание до температуры выше 50 °C (напр., под воздействием солнечных лучей). Не открывать баллончик с применением силы.

Это лекарственное средство нельзя выбрасывать в канализацию или с бытовыми отходами. Спросите в аптеке, как его утилизировать, если вы им больше не пользуетесь. Благодаря этому вы внесете вклад в защиту окружающей среды.

#### **6. Содержимое упаковки и дополнительная информация**

**Что содержит Jacutin® Pedicul Spray:**

- Активные вещества – аллетрин I и 5-[2-(2-бутоксиэтокси)этоксиметил]-6-пропил-1,3-бензодиоксил (пиперонилбутоксид). 1 баллончик 90 г (145 мл) спрея для применения на коже, раствор содержит: Аллетрин I 0,594 г; 5-[2-(2-бутоксиэтокси)этоксиметил]-6-пропил-1,3-бензодиоксил (пиперонилбутоксид) 2,376 г.
- Остальные компоненты: Изододекан; газообразователь из 2-метилпропана, бутана и пропана.

**Как выглядит Jacutin Pedicul Spray и что содержится в упаковке:**

**Jacutin Pedicul Spray** – это раствор, который в качестве спрея применяется для нанесения на кожу.

**Jacutin Pedicul Spray** продается в упаковках по 90 г (145 мл) в виде спрея.

**Фармацевтическое предприятие и изготовитель**

Almirall Hermal GmbH

Scholtzstraße 3, 21465 Reinbek

Телефон: (040) 727 04 0

Телефакс: (040) 7229296

info@almirall.de

www.almirall.de

**Редакция инструкции по применению от февраля 2015 года.**

